





T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu


KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞINDAN KORUNMA EĞİTİM REHBERİ




**KENEYİ HAFİFE ALMAYIN,
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN!**


**KENEYİ HAFİFE ALMAYIN,
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN!**







Kırım Kongo Kanamalı Ateşı,
kenedeki mikropların sebep olduđu
ölümle de sonuçlanabilen bir **hastalıktır.**





Kırım Kongo Kanamalı Ateşı, genellikle insanlara **kene tutunması** veya **keneye temas** sonucunda **bulaşır**.







Kırım Kongo Kanamalı Ateşı, hasta kişilerin veya mikrobu taşıyan hayvanların **kanlarına** ve **vücut sıvılarına** **korunmasız temas etmekle** de bulaşabilir.





Kırım Kongo Kanamalı Ateşı için **riskli alanlar**; baę, bahe, tarla, orman, orman kenarı tarım arazisi gibi kenenin bulunabileceęi yerlerdir.





Bağ, bahçe, tarla, orman gibi riskli alanlara giderken
açık renkli ve kapalı kıyafetler giyinin.







Bağ, bahçe, tarla, orman gibi riskli alanlara giderken **pantolon paçalarını çorap içine sokun** ya da **çizme giyinin**. Oturacağınız yere **açık renkli örtü serin**.








Hayvanların üzerindeki **keneye**, hayvanların **kan** ve **idrara** **çıplak elle dokunmayın.**










Riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudunuzun ve elbisenizin her yerine dikkatlice bakın. **Vücudunuzu** özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasıklar dahil **kontrol edin** ya da **ettirin**.








Riskli alanlardan döndükten sonra **çocuklarınızın**
vücudunu da mutlaka kene yönünden **kontrol edin.**






Vücudunuza tutunan **keneyi çıplak elle dokunmadan**;
eldiven, bez ya da poşet ile **çıkartın**, çıkaramıyorsanız en
yakın sağlık kuruluşuna gidin.





Kene tutunmasından sonra, **10 gün içinde;**
halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı,
bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden herhangi birini
görürseniz, zaman kaybetmeden
en yakın sağlık kuruluşuna gidin.





SAĞLIK KURULUŞU

